

EPITA

Mathématiques

Partiel (S3)

décembre 2018

Nom :

Prénom :

Entourer le nom de votre professeur de TD : Mme BOUDIN / M. GORON / M. RODOT

Classe :

NOTE :

Exercice 1 (5 points)


Soient $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -1 \\ -4 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -3 & 4 & -3 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

5

A et B sont-elles diagonalisables dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$? Si oui, déterminer D et P .

N.B. : l'obtention des sous-espaces propres sous forme de sous-espaces engendrés doit découler d'un raisonnement clair et non pas d'une manière hasardeuse en prenant directement des valeurs particulières.

[suite du cadre page suivante]



Exercice 2 (3 points)

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $A = \begin{pmatrix} 3 - a & -5 + a & a \\ -a & a - 2 & a \\ 5 & -5 & -2 \end{pmatrix}$.

Discuter de la diagonalisabilité de A dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ suivant les valeurs de a .

N.B. : la diagonalisation dans les cas favorables n'est pas demandée.

Exercice 3 (4 points)

1. Soit $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 & \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u, v, w) & \mapsto (2u - w; 3u + v + 2w) \end{cases}$

Déterminer la matrice de f relativement aux bases canoniques des espaces de départ et d'arrivée.

2. Soient $E = \mathbb{R}_2[X]$ et $f : \begin{cases} E & \rightarrow E \\ P(X) & \mapsto 2P(X + 1) + P(X - 1) - 2P(X) \end{cases}$

Déterminer la matrice de f relativement à la base canonique $(1, X, X^2)$ de $\mathbb{R}_2[X]$.

2,5

Exercice 4 (4 points)

Soient E, F deux \mathbb{R} -ev, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $X = (x_1, \dots, x_n)$ est une famille de vecteurs de E . Montrer que

1. $f(\text{Vect}(X)) = \text{Vect}(f(X))$.

2. $[f \text{ surjective et } \text{Vect}(X) = E] \implies \text{Vect}(f(X)) = F$.

3. $[f \text{ injective et } X \text{ libre}] \implies f(X) \text{ libre}$.

Exercice 5 (3 points)

1. Montrer que tout polynôme de degré impair à coefficients réels admet au moins une racine réelle.

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 + A + I = 0$ (*).

a. Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{R}}(A)$. Montrer que $\lambda^2 + \lambda + 1 = 0$.

b. Montrer qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ne peut pas vérifier l'équation (*).

Exercice 6 (2 points)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ et $(b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{R}^n$. Calculer le déterminant d'ordre $n+1$: $\Delta_n =$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & \dots & 1 \\ b_1 & a_1 & a_1 & \dots & \dots & a_1 \\ b_1 & b_2 & a_2 & \dots & \dots & a_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ b_1 & b_2 & \dots & \dots & b_n & a_n \end{vmatrix}$$